

## XIV Salão Iniciação Científica da PUCRS

### Aplicabilidade Clínica do Resultado de Enfermagem NOC Comportamento de Prevenção de Quedas em pacientes com o Diagnóstico de Enfermagem Mobilidade Física Prejudicada

Bruna Paulsen Panato

Orientadora: Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Miriam de Abreu Almeida

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem. Rua São Manoel, 963 Santa Cecília 90620110 - Porto Alegre, RS - Brasil

**Introdução:** A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição do quadril por uma prótese. Tais pacientes apresentam o Diagnóstico de enfermagem (DE) Mobilidade física prejudicada (MFP) que ocasiona maior risco de quedas. Devido a esse risco cabe à enfermagem avaliar o seu comportamento de prevenção de quedas. Para realizar essa avaliação a Nursing Outcomes Classification (NOC) propõem o Resultado de Enfermagem (RE) *Comportamento de Prevenção de Quedas* que tem por definição “ações pessoais ou de cuidador da família para minimizar fatores de risco capazes de precipitar quedas no ambiente pessoal” **Objetivo:** Verificar a aplicabilidade clínica do Resultado de Enfermagem NOC *Comportamento de Prevenção de Quedas* em pacientes com o Diagnóstico de Enfermagem *Mobilidade Física Prejudicada*, submetidos à Artroplastia Total Quadril. **Metodologia:** Estudo de coorte prospectivo, realizado em hospital universitário de agosto a setembro de 2012. Os sujeitos foram pacientes submetidos à ATQ e que atendiam aos critérios de inclusão. O instrumento de coleta de dados continha o RE *Comportamento de Prevenção de Quedas* seguido de sua definição e três indicadores (*Usa calçado adequado para prevenir quedas, Uso correto de dispositivos auxiliares e Solicita auxílio físico para si*) com suas definições conceituais e operacionais, além de uma escala likert de cinco pontos. Os pacientes foram avaliados durante pelo menos três dias consecutivos, por duplas de coletadoras treinadas, de forma simultânea e independente. Para a análise dos dados foi utilizado o teste *t-Student* para amostras pareadas. O nível de significância estatística utilizado foi de 5% ( $p < 0,05$ ). Para avaliar a concordância interobservadores foi aplicado o método de Bland-Altman. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. **Resultados:** Foram incluídos 21 pacientes no estudo sendo que destes 15 (71,4%) foram avaliados em um período de quatro dias e 6 (28,6%) em três dias. O RE *Comportamento de Prevenção de Quedas* apresentou aumento significativo do escore quando comparada a média da primeira com a da última avaliação ( $p < 0,001$ ). No primeiro dia de avaliação houve concordância significativa em 17 das 21 avaliações e no quarto dia em 9 das 21 avaliações. **Conclusões:** A diferença dos escores entre a primeira e última avaliação dos indicadores, além da concordância interobservadores demonstrou a aplicabilidade da NOC nos pacientes pesquisados. Os achados do presente estudo contribuem para a utilização do RE *Comportamento de Prevenção de Quedas* em cenário clínico real e, assim, mensurar os resultados das intervenções implementadas nos pacientes que realizaram ATQ.

#### Palavras-chave

Processos de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Avaliação de resultados (cuidados de saúde); Enfermagem ortopédica. Classificação; Terminologia