

XIV Salão Iniciação Científica da PUCRS

Achados preliminares da validação dos Indicadores NOC para o Resultado de Enfermagem Perfusão Tissular: Cerebral

Mariana Palma da Silva

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Miriam de Abreu Almeida

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem. Rua São Manoel, 963 Santa Cecília 90620110 - Porto Alegre, RS - Brasil

Introdução: Os Diagnósticos de Enfermagem (DE), as Intervenções e os Resultados de Enfermagem (RE) são elementos do Processo de Enfermagem (PE) nos quais se utiliza terminologias padronizadas. No hospital deste estudo foram implementados os diagnósticos da NANDA-Internacional, todavia ainda não é usada terminologia padronizada para avaliar a melhora, piora ou estagnação do estado do paciente em resposta ao cuidado de enfermagem prestado. A *Nursing Outcomes Classification* (NOC) é a classificação dos resultados mais conhecida em nosso meio e cada um dos 490 resultados (5ª edição) contém uma lista de indicadores e escalas likert de 5 pontos que mensuram do estado menos desejável ao mais desejável. Espera-se selecionar resultados e indicadores NOC para os DE mais frequentes na prática clínica. Um dos principais DE identificados em pacientes atendidos no setor de Emergência de um hospital universitário foi Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, que é definido pela NANDA-I como “Risco de redução na circulação do tecido cerebral”. **Objetivo:** Validar os indicadores NOC para o RE Perfusão Tissular: Cerebral na opinião de enfermeiros peritos. **Metodologia:** Estudo do tipo validação de conteúdo de resultados NOC, que consiste na verificação do grau de concordância dos seus elementos por enfermeiros peritos. A coleta de dados está sendo realizada em um hospital universitário, em duas etapas. Na primeira etapa os resultados sugeridos pela ligação NOC-NANDA-I para o DE em estudo foram validados por consenso de enfermeiros peritos na área de adulto crítico, que atenderam critérios de inclusão. Na segunda etapa, elaborou-se um instrumento contendo os três RE validados na etapa anterior, seus indicadores e uma escala Likert de 5 pontos (não importante–extremamente importante). A análise dos dados é feita pela estatística descritiva, utilizando-se a média ponderada das notas atribuídas pelos peritos para cada resultado. Definiu-se o ponto de corte em 0,80. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital. **Resultados preliminares:** Até o momento, 11 enfermeiros peritos responderam o instrumento de coleta. Dos 18 indicadores do RE Perfusão Tissular: Cerebral, três foram validados (16,66%), quais sejam: Pressão arterial sistólica (média 0,86), Pressão arterial diastólica (0,84) e Reflexos neurológicos prejudicados (0,88). **Considerações finais:** Os RE contribuem na avaliação das intervenções de enfermagem e na evolução do estado do paciente. Os Indicadores, por sua vez, auxiliam no entendimento, na escolha e na aplicação dos RE. Além disso, oferece subsídios para a complementação do PE informatizado da instituição dando visibilidade à prática profissional.

Palavras-chave

Processos de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Avaliação de resultados (cuidados de saúde); Enfermagem em Emergência; Classificação; Terminologia.