

XIV Salão Iniciação Científica da PUCRS

Avaliação da Qualidade de Vida em Pacientes com Síndrome da Ardência Bucal, Ulceração Aftosa Recorrente e Líquen Plano Oral

Elisa Zancanaro de Figueiredo; Fernanda Gonçalves Salum.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Odontologia, Avenida Ipiranga 6681, Prédio 6.

A síndrome da ardência bucal (SAB), o líquen plano oral (LPO) e a ulceração aftosa recorrente (UAR) são doenças complexas de etiologia desconhecida e, possivelmente, multifatorial que podem acarretar dor e desconforto aos pacientes, afetando o seu bem-estar geral. Este estudo clínico transversal teve como objetivo avaliar o impacto da SAB, da UAR e do LPO na qualidade de vida dos indivíduos. Foram selecionados 146 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 31 e 92 anos, provenientes do Serviço de Estomatologia e da Faculdade de Odontologia da PUCRS, os quais foram distribuídos em grupo-SAB (n=49), grupo-LPO (n=29), grupo-UAR (n=29) e grupo-controle (n=39). Para avaliar a qualidade de vida geral e relacionada à saúde bucal foram empregados o Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-26) e a versão brasileira do questionário *Oral Health Impact Profile* (OHIP14), respectivamente. Quanto maiores os valores obtidos nos domínios físico, psicológico, social e meio ambiente do questionário WHOQOL-26, melhor é a qualidade de vida do paciente, por outro lado, valores superiores do instrumento OHIP14 indicam um maior impacto da condição bucal na qualidade de vida. Os dados foram analisados por meio do software SPSS versão 20.0, considerando-se um nível de significância de 5%. No domínio meio ambiente do WHOQOL-26 não houve diferença significativa entre os grupos. No domínio social, os grupos SAB, LPO e UAR demonstraram valores significativamente inferiores aos do grupo-controle. No domínio físico, o grupo-SAB apresentou valores significativamente inferiores em relação ao grupo-LPO. No domínio psicológico, o grupo-SAB apresentou valores inferiores aos do grupo-controle, mas não diferiu significativamente quando comparado aos grupos LPO e UAR. Quando os escores do instrumento OHIP14 foram comparados entre os grupos, foram observados valores significativamente superiores nos grupos SAB, LPO e UAR em relação ao controle. O grupo-SAB também apresentou valores significativamente superiores em comparação ao grupo-LPO. Os resultados demonstram que a SAB, a UAR e o LPO exercem impacto negativo na qualidade de vida geral e relacionada à saúde bucal dos pacientes. Além disso, entre as doenças bucais investigadas a que apresenta maior impacto na qualidade de vida dos indivíduos é a SAB. O cirurgião-dentista deve avaliar pacientes com essas doenças dentro de um contexto mais amplo, considerando que as mesmas podem interferir na saúde geral e na qualidade de vida dos indivíduos.

Palavras-chave

Líquen Plano Oral; Ulceração Aftosa Recorrente; Síndrome da Ardência Bucal; Qualidade de Vida.